

# PROFIL SANTÉ 2021

## CPTS Nord Est Mayennais

# Comment lire les indicateurs ?

## Résultats présentés pour chaque indicateur

C1		C2			Indicateur de comparaison				Graphique avec positionnement des territoires par rapport à la moyenne nationale (référence en base 100, représentée par le trait noir)
Numéro	Libellé de l'indicateur	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	
		Effectif de personnes, décès, professionnels...	Taux brut	Évolution en taux de croissance annuel moyen	Valeur territoire étudié	Valeur pour la Mayenne	Valeur régionale	Valeur nationale	

■ CPTS Nord Est Mayennais ■ Mayenne ■ Pays de la Loire

Pour les volets A, B, F, les indicateurs de comparaison correspondent à des taux, des densités ou des accessibilités potentielles localisées (APL). Pour les volets C, D, E, G, il s'agit principalement d'indices comparatifs.

### Exemple 1

#### VOLET B - Familles monoparentales (indicateur 20) - Comparaison établie à partir d'un taux

C1		CPTS			Indicateur de comparaison				Comparaison à la moyenne nationale France
Effectif	Taux	Évolution annuelle	CPTS	Mayenne	Pays de la Loire	France métrop.			
C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9			
20	Familles monoparentales	599	6%	+3,7%	cf. C4	7%	8%	10%	■ ■

En 2018, la population de la CPTS Nord Est Mayennais compte 599 familles monoparentales (C3). Cet effectif représente 6 % des ménages (C4 et C6).

Entre 2013 et 2018, le taux de familles monoparentales a augmenté en moyenne de 3,7 % par an (C5).

La Mayenne compte 7 % de familles monoparentales (C7), les Pays de la Loire 8 % (C8) et la France métropolitaine 10 % (C9).

Le taux de familles monoparentales dans la population de la CPTS Nord Est Mayennais est donc inférieur au taux observé en Mayenne, dans les Pays de la Loire et en France. Le graphique permet d'illustrer ces comparaisons.

### Exemple 2

#### VOLET E - Personnes prises en charge pour dépression et autres troubles de l'humeur (indicateur 149)

#### Comparaison établie à partir d'un indice comparatif

C1		CPTS			Indicateur de comparaison				Comparaison à la moyenne nationale France
Effectif	Taux	Évolution annuelle	CPTS	Mayenne	Pays de la Loire	France métrop.			
C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9			
149	Personnes prises en charge pour dépression et autres troubles de l'humeur*	320	2,3%	nc	150	108	86	100	■ ■ ■

\* Données concernant uniquement les bénéficiaires du régime général d'assurance maladie et des sections locales mutualistes.

nc : non calculé.

En 2018, 320 habitants de la CPTS Nord Est Mayennais, relevant du régime général (sections locales mutualistes comprises), ont été pris en charge pour une dépression ou d'autres troubles de l'humeur (C3). Cela représente 2,0 % des habitants de ce territoire relevant du régime général (C4).

La comparaison de la situation de la CPTS avec celle de la Mayenne, des Pays de la Loire et la France repose sur un indice comparatif (IC) de prise en charge.

Cet indice est calculé en faisant le rapport entre le nombre d'habitants du territoire effectivement pris en charge, et le nombre d'habitants pris en charge que l'on obtiendrait si la population de ce territoire présentait des taux de prises en charge par classe d'âge identiques à ceux de la population française. Cette méthode permet de "gommer" l'impact d'éventuelles différences de structure par âge entre la population de la CPTS et celle de la France.

L'IC de la CPTS est de 150 (C6), donc supérieur à l'IC de la France qui par définition est égal à 100 (C9). La prévalence des prises en charge pour une dépression ou d'autres troubles de l'humeur dans la population de la CPTS est donc, à structure d'âge identique, supérieure de 50 % à la moyenne nationale. Avec un IC de 108 (C7), la Mayenne présente une prévalence supérieure de 8 % à la moyenne nationale alors que les Pays de la Loire avec un IC de 86 (C8) a une prévalence inférieure de 14 % à la France. Le graphique permet d'illustrer ces comparaisons.

## Résultats présentés pour chaque indicateur

C1 Numéro	C2 Libellé de l'indicateur	C3 Effectif de personnes, décès, professionnels...	C4 Taux brut	C5 Évolution en taux de croissance annuel moyen	Indicateur de comparaison				Graphique avec positionnement des territoires par rapport à la moyenne nationale (référence en base 100, représentée par le trait noir)
					C6 Valeur territoire étudié	C7 Valeur pour la Mayenne	C8 Valeur régionale	C9 Valeur nationale	

■ CPTS Nord Est Mayennais ■ Mayenne ■ Pays de la Loire

Pour les volets A, B, F, les indicateurs de comparaison correspondent à des taux, des densités ou des accessibilités potentielles localisées (APL). Pour les volets C, D, E, G, il s'agit principalement d'indices comparatifs.

### Exemple 3

#### VOLET F - Médecins généralistes libéraux "désinstallés" depuis 5 ans (indicateur 163)

##### Comparaison établie à partir d'un taux

C1	C2	CPTS			Indicateur de comparaison				Comparaison à la moyenne nationale France
		Effectif C3	Taux C4	Évolution annuelle C5	CPTS C6	Mayenne C7	Pays de la Loire C8	France métrop. C9	
163	Médecins généralistes libéraux "désinstallés" depuis 5 ans	4	31%	nc	cf. C4	30%	26%	24%	■ ■

nc : non calculé.

4 médecins généralistes libéraux qui exerçaient sur le territoire de la CPTS en septembre 2016 se sont "désinstallés" entre septembre 2016 et septembre 2021 (C3). Cela correspond à 31 % du nombre total de médecins exerçant sur le territoire en septembre 2016 (C4 et C6).

Cette proportion est proche de celle observée en Mayenne (30 %, C7), et supérieure à celle observée dans les Pays de la Loire (26 %, C8) et en France métropolitaine (24 %, C9). Le graphique permet d'illustrer ces comparaisons.

### Exemple 4

#### VOLET G - Personnes ayant eu recours à un dermatologue\* (indicateur 194)

##### Comparaison établie à partir d'un indice comparatif

C1	C2	CPTS			Indicateur de comparaison				Comparaison à la moyenne nationale France
		Effectif C3	Taux C4	Évolution annuelle C5	CPTS C6	Mayenne C7	Pays de la Loire C8	France métrop. C9	
194	Personnes ayant eu recours à un dermatologue	1 350	6,7%	nc	60	84	83	100	■ ■ ■

\* Au moins une fois dans l'année, en cabinet de ville, centre de santé (dont centre de soins infirmiers), centre mutualiste, consultation externe d'établissement hospitalier, service de protection maternelle et infantile (PMI).  
nc : non calculé.

Au cours de l'année 2019, 1 350 habitants de la CPTS Nord Est Mayennais ont eu au moins un recours à un dermatologue (C3). Cela représente 7 % des habitants de ce territoire (C4).

La comparaison de la situation de la CPTS avec celle de la Mayenne, des Pays de la Loire et la France repose sur un indice comparatif (IC) de recours.

Cet indice est calculé en faisant le rapport entre le nombre d'habitants du territoire ayant effectivement eu au moins un recours, et le nombre d'habitants ayant eu au moins un recours que l'on obtiendrait si la population de ce territoire présentait des taux de recours par classe d'âge identiques à ceux de la population française. Cette méthode permet de "gommer" l'impact d'éventuelles différences de structure par âge entre la population de la CPTS et celle de la France.

L'IC de la CPTS est de 60 (C6), donc inférieur à l'IC de la France qui par définition est égal à 100 (C9). Le taux de recours au dermatologue des habitants de la CPTS est donc, à structure d'âge identique, inférieur de 40 % à la moyenne nationale. Avec des IC de respectivement 84 et 83 (C7 et C8), la Mayenne et les Pays de la Loire présentent des taux de recours inférieurs de 16 % et 17 % à la moyenne nationale. Le graphique permet d'illustrer ces comparaisons.