

Comment lire les indicateurs ?

Résultats présentés pour chaque indicateur

C1	C2	C3	C4	C5	Indicateur de comparaison				Graphique avec positionnement des territoires par rapport à la moyenne nationale (référence en base 100, représentée par le trait noir)
Numéro	Libellé de l'indicateur	Effectif de personnes, décès, professionnels...	Taux brut	Évolution en taux de croissance annuel moyen	Valeur territoire étudié	Valeur pour la Loire-Atlantique	Valeur régionale	Valeur nationale	

■ CPTS Loire et Lac ■ Loire-Atlantique ■ Pays de la Loire

Pour les volets A, B, F, les indicateurs de comparaison correspondent à des taux, des densités ou des accessibilités potentielles localisées (APL). Pour les volets C, D, E, G, il s'agit principalement d'indices comparatifs.

Exemple 1

VOLET B - Familles monoparentales (indicateur 20) - Comparaison établie à partir d'un taux

C1	C2	CPTS			Indicateur de comparaison				Comparaison à la moyenne nationale France
		Effectif	Taux	Évolution annuelle	CPTS	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	France métrop.	
C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9			
20	Familles monoparentales	2 412	10%	+4,1%	cf. C4	8%	8%	10%	■ ■ ■

En 2018, la population de la CPTS Loire et Lac compte 2 412 familles monoparentales (C3). Cet effectif représente 10 % des ménages (C4 et C6).

Entre 2013 et 2018, le taux de familles monoparentales a augmenté en moyenne de +4,1 % par an (C5).

La Loire-Atlantique compte 8 % de familles monoparentales (C7), les Pays de la Loire 8 % (C8) et la France métropolitaine 10 % (C9).

Le taux de familles monoparentales dans la population de la CPTS Loire et Lac est donc supérieur au taux observé dans les Pays de la Loire et en Loire-Atlantique. Le graphique permet d'illustrer ces comparaisons.

Exemple 2

VOLET E - Personnes prises en charge pour dépression et autres troubles de l'humeur (indicateur 149)

Comparaison établie à partir d'un indice comparatif

C1	C2	CPTS			Indicateur de comparaison				Comparaison à la moyenne nationale France
		Effectif	Taux	Évolution annuelle	CPTS	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	France métrop.	
C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9			
149	Personnes prises en charge pour dépression et autres troubles de l'humeur	450	0,7%	nc	57	78	87	100	■ ■ ■

nc : non calculé.

En 2018, 450 habitants de la CPTS Loire et Lac ont été pris en charge pour une dépression ou d'autres troubles de l'humeur (C3). Cela représente 0,7 % des habitants de ce territoire (C4).

La comparaison de la situation de la CPTS avec celle de la Loire-Atlantique, des Pays de la Loire et la France repose sur un indice comparatif (IC) de prise en charge.

Cet indice est calculé en faisant le rapport entre le nombre d'habitants du territoire effectivement pris en charge, et le nombre d'habitants pris en charge que l'on obtiendrait si la population de ce territoire présentait des taux de prises en charge par classe d'âge identiques à ceux de la population française. Cette méthode permet de "gommer" l'impact d'éventuelles différences de structure par âge entre la population de la CPTS et celle de la France.

L'IC de la CPTS est de 57 (C6), donc inférieur à l'IC de la France qui par définition est égal à 100 (C9). La prévalence des prises en charge pour une dépression ou d'autres troubles de l'humeur dans la population de la CPTS est donc, à structure d'âge identique, inférieure de 43 % à la moyenne nationale. Avec des IC de respectivement 78 et 87 (C7 et C8), la Loire-Atlantique et les Pays de la Loire présentent des prévalences inférieures de 22 % et de 13 % à la moyenne nationale. Le graphique permet d'illustrer ces comparaisons.

Résultats présentés pour chaque indicateur

C1 Numéro	C2 Libellé de l'indicateur	C3 Effectif de personnes, décès, professionnels...	C4 Taux brut	C5 Évolution en taux de croissance annuel moyen	C6 Valeur territoire étudié	Indicateur de comparaison			Graphique avec positionnement des territoires par rapport à la moyenne nationale (référence en base 100, représentée par le trait noir)
						C7 Valeur pour la Loire-Atlantique	C8 Valeur régionale	C9 Valeur nationale	

■ CPTS Loire et Lac ■ Loire-Atlantique ■ Pays de la Loire

Pour les volets A, B, F, les indicateurs de comparaison correspondent à des taux, des densités ou des accessibilités potentielles localisées (APL). Pour les volets C, D, E, G, il s'agit principalement d'indices comparatifs.

Exemple 3

VOLET F - Médecins généralistes libéraux "désinstallés" depuis 5 ans (indicateur 163)

Comparaison établie à partir d'un taux

C1	C2	CPTS			Indicateur de comparaison			Comparaison à la moyenne nationale France	
		Effectif C3	Taux C4	Évolution annuelle C5	CPTS C6	Loire-Atlantique C7	Pays de la Loire C8		France métrop. C9
163	Médecins généralistes libéraux "désinstallés" depuis 5 ans	9	16%	nc	cf. C4	26%	28%	25%	

nc : non calculé.

9 médecins généralistes libéraux qui exerçaient sur le territoire de la CPTS en mai 2017 se sont "désinstallés" entre mai 2017 et mai 2022 (C3). Cela correspond à 16 % du nombre total de médecins exerçant sur le territoire en mai 2017 (C4 et C6). Cette proportion est inférieure à celle observée en Loire-Atlantique (26 %, C7), en Pays de la Loire (28 %, C8) et en France métropolitaine (25 %, C9). Le graphique permet d'illustrer ces comparaisons.

Exemple 4

VOLET G - Personnes ayant eu recours à un dermatologue* (indicateur 194)

Comparaison établie à partir d'un indice comparatif

C1	C2	CPTS			Indicateur de comparaison			Comparaison à la moyenne nationale France	
		Effectif C3	Taux C4	Évolution annuelle C5	CPTS C6	Loire-Atlantique C7	Pays de la Loire C8		France métrop. C9
194	Personnes ayant eu recours à un dermatologue	5 300	8,9%	nc	88	92	83	100	

* Au moins une fois dans l'année, en cabinet de ville, centre de santé (dont centre de soins infirmiers), centre mutualiste, consultation externe d'établissement hospitalier, service de protection maternelle et infantile (PMI).
nc : non calculé.

Au cours de l'année 2019, 5 300 habitants de la CPTS Loire et Lac ont eu au moins un recours à un dermatologue (C3). Cela représente 8,9 % des habitants de ce territoire (C4).

La comparaison de la situation de la CPTS avec celle de la Loire-Atlantique, des Pays de la Loire et la France repose sur un indice comparatif (IC) de recours.

Cet indice est calculé en faisant le rapport entre le nombre d'habitants du territoire ayant effectivement eu au moins un recours, et le nombre d'habitants ayant eu au moins un recours que l'on obtiendrait si la population de ce territoire présentait des taux de recours par classe d'âge identiques à ceux de la population française. Cette méthode permet de "gommer" l'impact d'éventuelles différences de structure par âge entre la population de la CPTS et celle de la France.

L'IC de la CPTS est de 88 (C6), donc inférieur à l'IC de la France qui par définition est égal à 100 (C9). Le taux de recours au dermatologue des habitants de la CPTS est donc, à structure d'âge identique, inférieur de 12 % à la moyenne nationale. Avec des IC de respectivement 92 et 83 (C7 et C8), la Loire-Atlantique et les Pays de la Loire présentent des taux de recours inférieurs de 8 % et 17 % à la moyenne nationale. Le graphique permet d'illustrer ces comparaisons.